

Tabla 6.25. Análisis univariado y multivariado de las variables síntoma debut y localización.

| Variables | N | % | MORTALIDAD GLOBAL | | | | RECIDIVA | | | | MORTALIDAD POR CANCER ORAL | | | |
|----------------------|----|----|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | n | LR ¹ | RRa ² (95% IC) | RRb ³ (95% IC) | n | LR ¹ | RRa ² (95% IC) | RRb ³ (95% IC) | n | LR ¹ | RRa ² (95% IC) | RRb ³ (95% IC) |
| SINTOMA | | | | | | | | | | | | | | |
| Adenopatía | 19 | 12 | 13 | 0,04 | 1.0 (ref.) ⁴ | 1.0 (ref.) | 9 | 0,63 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 10 | 0,03 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Dolor orofaríngeo | 53 | 34 | 31 | | 0,66(0,34-1,28) | 0,67 (0,35-1,30) | 19 | | 0,63 (0,28-1,42) | 0,96(0,35-2,61) | 18 | | 0,58 (0,25-1,35) | 0,59 (0,28-1,24) |
| Lesión C. oral | 78 | 50 | 31 | | 0,53(0,27-1,0) | 0,59 (0,29-1,18) | 23 | | 0,58(0,26-1,30) | 0,86(0,30-2,45) | 21 | | 0,58 (0,23-1,46) | 0,52 (0,22-1,22) |
| Otros | 4 | 3 | 3 | | 2,42(0,62-9,47) | 1,99(0,51-7,72) | 1 | | 0,42(0,05-3,52) | 0,00(0,00-) | 3 | | 1,47 (0,28-7,60) | 1,16 (0,23-5,78) |
| Desconocido | 1 | 1 | 0 | | — | — | 0 | | — | — | 0 | | — | — |
| LOCALIZACION | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>L. por Grupos</u> | | | | | 0,35 | | | | 0,01 | | | | 0,63 | |
| Cavidad Oral | 11 | 75 | 53 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 37 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 36 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Glándulas | 5 | 3 | 2 | | 0,86(0,21-3,61) | 0,85(0,20-3,95) | 4 | | 5,04(1,64-15,44) | 5,16(1,70-15,69) | 2 | | 0,74 (0,15-3,42) | 0,98 (0,22-4,35) |
| Orofaringe | 33 | 22 | 21 | | 1,32(0,77-2,31) | 1,36(0,77-2,41) | 10 | | 0,72(0,34-1,54) | 0,71(0,33-1,52) | 13 | | 1,08 (0,55-2,11) | 0,99 (0,49-2,01) |
| <u>L. por áreas</u> | | | | | 0,69 | | | | 0,02 | | | | 0,71 | |
| Lengua | 44 | 29 | 17 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 13 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 11 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Glándulas | 5 | 3 | 2 | | 0,94(0,21-4,23) | 0,96 (0,23-4,33) | 4 | | 4,79(1,44-15,92) | 4,93(1,48-16,50) | 2 | | 1,22 (0,25-5,79) | 1,13(0,23-5,73) |
| Encía | 4 | 3 | 2 | | 2,14(0,42-10,96) | 1,22 (0,22-6,63) | 3 | | 8,66(1,75-42,86) | 7,05(1,37-36,26) | 2 | | 4,51(0,76-26,53) | 2,24(0,31-15,79) |
| Suelo de boca | 23 | 15 | 11 | | 1,23(0,56-2,70) | 1,27 (0,57-2,80) | 8 | | 1,10(0,45-2,70) | 1,11(0,45-2,69) | 10 | | 1,32(0,53-3,23) | 1,31(0,53-3,23) |
| Otras partes no | 44 | 29 | 23 | | 1,11(0,58-2,16) | 1,14 (0,59-2,22) | 13 | | 0,82(0,37-1,84) | 0,87(0,39-1,97) | 13 | | 0,94(0,40-2,23) | 1,12(0,47-2,67) |
| Orofaringe | 33 | 22 | 21 | | 1,47(0,74-2,96) | 1,53 (0,76-3,08) | 10 | | 0,71 (0,29-1,70) | 0,71(0,30-1,71) | 13 | | 1,17(0,48-2,81) | 1,13(0,47-2,68) |

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.26. Análisis univariado y multivariado de las variables demora del diagnóstico e histología.

| Variables | N | % | MORTALIDAD GLOBAL | | | | RECIDIVA | | | | MORTALIDAD POR CANCER ORAL | | | |
|-------------------------|-----|----|-------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------|------------------|-------------------------|
| | | | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) |
| DEMORA | | | | | | | | | | | | | | |
| No | 40 | 26 | 17 | 0,20 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 8 | 0,03 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 9 | 0,10 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Sí | 115 | 74 | 61 | | 1.47(0.86-2.52) | 1,55 (0,90-2,68) | 44 | | 2,19(1,02-4,66) | 2,41(1,11-5,23) | 43 | | 1,89(0,92-3,88) | 2,10(1,01-4,35) |
| <i>Tendencia</i> | | | | | | N.S. | | | | | | | | P=0,03 |
| Tiempo medio | | | | | | | | | | | | | | |
| <1 mes | 36 | 23 | 16 | 0,43 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 6 | 0,11 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 8 | 0,41 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| 1-3 meses | 57 | 37 | 32 | | 1.50(0.82-2.75) | 1,47(0,79-2,71) | 22 | | 2,61(1,05-6,46) | 2,82(1,11-7,16) | 21 | | 1,92 (0,85-4,34) | 2,02 (0,88-4,61) |
| >3 meses | 58 | 37 | 29 | | 1.32(0.71-2.44) | 1,51(0,81-2,83) | 22 | | 2,78 (1,12-6,89) | 3,17(1,25-8,01) | 22 | | 2,00 (0,88-4,52) | 2,38 (1,03-5,52) |
| desconocido | 4 | 3 | 1 | | 0.58(0.07-4.43) | 0,58(0,07-4,47) | 2 | | 3,93 (0,78-9,82) | 3,97(0,77-20,42) | 1 | | 1,50 (0,18-2,22) | 1,53 (0,18-13,00) |
| <i>Tendencia</i> | | | | | | N.S. | | | | | | | | N.S. |
| Motivo de demora | | | | | | | | | | | | | | |
| Paciente | 82 | 69 | 51 | 0,01 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 35 | 0,44 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 36 | 0,11 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Medico | 19 | 16 | 8 | | 0,50(0,24-1,07) | 0,40(0,18-0,86) | 6 | | 0,70(0,29-1,70) | 0,71(0,29-1,73) | 5 | | 0,58 (0,22-1,49) | 0,42 (0,16-1,12) |
| Dentista | 8 | 7 | 2 | | 0,34(0,08-1,45) | 0,44(0,10-1,88) | 3 | | 0,80(0,24-2,65) | 0,89(0,26-3,01) | 2 | | 0,46 (0,11-1,93) | 0,56 (0,12-2,46) |
| Otros | 5 | 4 | 0 | | — | — | 0 | | — | — | 0 | | — | — |
| Desconocido | 5 | 4 | 1 | | 0,23(0,03-1,72) | 0,18(0,02-1,32) | 2 | | 0,95(0,22-4,07) | 0,91(0,21-3,85) | 1 | | 0,41 (0,06-3,10) | 0,29 (0,03-2,21) |
| <i>Tendencia</i> | | | | | | | | | | | | | | N.S. |
| HISTOLOGIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Ca. Escamoso | 149 | 96 | 77 | 0,29 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 50 | 0,47 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 51 | 0,49 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Linfoma | 2 | 1 | 0 | | — | — | 0 | | — | — | 0 | | — | — |
| Otros | 4 | 3 | 1 | | 0.47(0.06-∞) | 0,72(0,07-6,98) | 2 | | 1,80(0,42-7,69) | 1,41(0,27-7,11) | 1 | | 0,64(0,09-4,68) | 1,03(0,08-13,16) |

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.27. Análisis univariado y multivariado de las variables estadio clínico y patológico, y tratamiento.

| Variables | N | % | MORTALIDAD GLOBAL | | | | RECIDIVA | | | | MORTALIDAD POR CANCER ORAL | | | |
|---------------------------|-----|----|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) |
| EST. CLÍNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| E. por grupos | | | | 0,00 | | | | 0,09 | | | | | 0,00 | |
| Precoz | 47 | 30 | 13 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 11 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 3 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Avanzado | 106 | 68 | 65 | | 2,99 (1622,0-5530,0) | 2,88 (1,55-5,35) | 41 | | 1,81 (0,91-3,61) | 1,91 (0,95-3,79) | 49 | | 9,94 (3,05-32,40) | 9,92 (3,03-32,40) |
| IA | 2 | 1 | 0 | | — | — | 0 | | — | — | 0 | | — | — |
| Clasificación | | | | 0,00 | | | | 0,23 | | | | 0,00 | | |
| IV | 15 | 10 | 50 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 28 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 39 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| III | 31 | 20 | 15 | | 0,38 (0,21-0,69) | 0,40 (0,21-0,73) | 13 | | 0,76 (0,38-1,49) | 0,79 (0,39-1,59) | 10 | | 0,38 (0,19-0,78) | 0,37 (0,18-0,76) |
| II | 36 | 23 | 12 | | 0,35 (0,18-0,67) | 0,36 (0,18-0,70) | 8 | | 0,54 (0,24-1,21) | 0,54 (0,23-1,22) | 3 | | 0,12 (0,03-0,39) | 0,11 (0,03-0,38) |
| I | 70 | 45 | 1 | | 0,05 (0,00-0,39) | 0,05 (0,00-0,41) | 3 | | 0,44 (0,13-1,48) | 0,39 (0,11-1,33) | 0 | | 0,00 (0,00-∞) | 0,00 (0,00-∞) |
| Otros | 3 | 2 | 0 | | 0,00 (0,00-∞) | 0,00 (0,00-∞) | 0 | | — | — | 0 | | — | — |
| <i>Tendencia</i> | | | | | | <i>P=0,00</i> | | | | <i>P=0,03</i> | | | | <i>P=0,00</i> |
| TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| CIR +/- RDT | 96 | 62 | 36 | 0,00 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 33 | 0,79 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 22 | 0,00 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| RDT +/- QTX | 46 | 30 | 30 | | 2,14 (1295,0-3546,0) | 2,88 (1,64-5,07) | 16 | | 0,99 (0,538-1,83) | 1,32 (0,67-2,59) | 19 | | 2,01 (1,07-3,79) | 3,81 (1,78-8,12) |
| Otros | 13 | 8 | 12 | | 3801,0 (3801,0-15278,0) | 10,47 (4,98-22,01) | 3 | | 0,70 (0,215-2,33) | 0,64 (0,19-2,13) | 11 | | 9,26 (4,29-19,99) | 10,65 (4,65-24,37) |
| ET. PATOLOGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Estadio por grupos | | | | 0,00 | | | | 0,06 | | | | 0,00 | | |
| Precoz | 36 | 36 | 6 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 9 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 3 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Avanzado | 63 | 64 | 33 | | 3,74 (1552,00-9059,00) | 3,85 (1,59-9,34) | 27 | | 1,87 (0,866-4,05) | 1,83 (0,84-3,98) | 22 | | 5,53 (1,63-18,69) | 5,80 (1,71-19,63) |
| <i>Tendencia</i> | | | | | | | | | | | | | | <i>P< 0,05</i> |
| Clasificación | | | | 0,00 | | | | 0,07 | | | | 0,00 | | |
| I | 20 | 20 | 3 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 3 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 1 | | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| II | 16 | 16 | 3 | | 1,36 (0,26-∞) | 1,45 (0,28-7,49) | 6 | | 2,56 (0,605-10,88) | 2,51 (0,58-10,74) | 2 | | 2,88 (0,25-32,73) | 3,10 (0,27-35,88) |
| III | 30 | 30 | 13 | | 3,23 (0,90-∞) | 3,38 (0,94-12,09) | 11 | | 2,41 (0,656-8,92) | 2,44 (0,66-9,01) | 7 | | 6,53 (0,78-54,20) | 6,98 (0,84-58,00) |
| IV | 33 | 33 | 20 | | 5,63 (1620,00-19571,00) | 6,10 (1,74-21,38) | 16 | | 4,06 (1,135-14,56) | 3,83 (1,05-13,89) | 15 | | 13,15 (1,69-102,34) | 14,84(1,89-116,27) |

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.28. Análisis univariado y multivariado de las variables biológicas.

| Variables | N | % | MORTALIDAD GLOBAL | | | | RECIDIVA | | | | MORTALIDAD POR CANCER ORAL | | | |
|--|-----|----|-------------------|------|-----------------|-----------------|----------|------|-----------------|------------------|----------------------------|------|------------------|------------------|
| | | | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) | n | LR | RRa (95% IC) | RRb (95% IC) |
| ADN del VPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Negativo | 104 | 67 | 51 | 0,47 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 37 | 0,66 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 34 | 0,87 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Positivo | 4 | 3 | 2 | | 1,02(0,24-4,27) | 2,01(0,45-8,85) | 2 | | 2,07(0,48-8,78) | 1,45(0,30-6,97) | 1 | | 1,36(0,18-10,28) | 4,34(0,54-34,60) |
| Inadecuado | 10 | 6 | 3 | | 0,80(0,24-2,62) | 0,81(0,24-2,66) | 2 | | 0,56(0,13-2,35) | 0,47(0,11-2,00) | 3 | | 1,06(0,32-3,52) | 0,96(0,28-3,33) |
| No testado | 37 | 24 | 22 | | 1,45(0,86-2,42) | 1,64(0,95-2,84) | 11 | | 0,90(0,45-1,79) | 0,71(0,33-1,51) | 14 | | 1,30(0,69-2,47) | 1,67(0,86-3,27) |
| AC contra la proteína L1 del VPH 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Negativo | 137 | 88 | 69 | 0,77 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 48 | 0,39 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 49 | 0,58 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Positivo | 8 | 5 | 5 | | 1,26(0,49-3,20) | 0,93(0,33-2,67) | 1 | | 0,33(0,04-2,4) | 0,18(0,02-1,56) | 1 | | 0,80(0,11-6,03) | 0,80(0,11-6,03) |
| No testado | 10 | 6 | 4 | | 0,68(0,24-1,89) | 0,81(0,28-2,30) | 3 | | 0,74(0,22-2,42) | 0,88(0,26-2,94) | 2 | | 0,39(0,09-1,66) | 0,54(0,12-2,34) |
| AC contra la proteína E6 del VPH 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Negativo | 144 | 93 | 73 | 0,93 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 48 | 0,95 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 49 | 0,79 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Positivo | 2 | 1 | 1 | | 0,63(0,08-4,59) | 0,39(0,05-3,00) | 1 | | 1,31(0,17-9,70) | 1,60(0,20-12,79) | 1 | | 0,88(0,12-6,48) | 0,61(0,07-4,79) |
| No testado | 9 | 6 | 4 | | 0,78(0,27-2,16) | 0,89(0,31-2,50) | 3 | | 0,87(0,26-2,85) | 0,97(0,29-3,19) | 2 | | 0,47(0,11-1,96) | 0,56(0,13-2,41) |
| AC contra la proteína E7 del VPH 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Negativo | 143 | 92 | 72 | 0,88 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 49 | 0,52 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 50 | 0,60 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Positivo | 3 | 9 | 2 | | 1,24(0,30-5,14) | 1,55(0,37-6,52) | 0 | | — | — | 0 | | — | — |
| No testado | 9 | 6 | 4 | | 0,78(0,28-2,18) | 0,90(0,32-2,55) | 3 | | 0,86(0,26-2,81) | 0,95(0,28-3,13) | 2 | | 0,47(0,11-1,96) | 0,56(0,13-2,42) |
| AC contra las proteínas del VPH E6/E7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Negativo | 141 | 91 | 71 | 0,97 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 48 | 0,75 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) | 49 | 0,71 | 1.0 (ref.) | 1.0 (ref.) |
| Positivo | 5 | 3 | 3 | | 0,94(0,29-3,03) | 0,81(0,24-2,66) | 1 | | 0,50(0,06-3,66) | 0,56(0,07-4,20) | 1 | | 0,62(0,08-4,58) | 0,56(0,07-4,35) |
| No testado | 9 | 6 | 4 | | 0,78(0,28-2,17) | 0,89(0,31-2,51) | 3 | | 0,86(0,26-2,81) | 0,95(0,29-3,14) | 2 | | 0,47(0,11-1,95) | 0,56(0,13-2,40) |

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.29. Modelo final de variables ajustadas.

| | MORTALIDAD GLOBAL | | RECIDIVA | | MORTALIDAD C. ORAL | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | n | RRc ¹ (95% IC) | n | RRc ¹ (95% IC) | n | RRc ¹ (95% IC) |
| EDAD | | | | | | |
| <50 | 17 | 1.0 (ref.) ² | 16 | 1.0 (ref.) | 15 | 1.0 (ref.) |
| 50-59 | 23 | 1,27 (0,66-2,46) | 14 | 0,78 (0,36-1,71) | 16 | 1,19 (0,57-2,52) |
| 60-69 | 23 | 1,19 (0,61-2,33) | 14 | 0,51 (0,23-1,12) | 12 | 0,92 (0,41-2,09) |
| >70 | 15 | 2,20 (1,04-4,85) | 8 | 0,75 (0,30-1,85) | 9 | 2,34 (0,90-6,06) |
| SEXO | | | | | | |
| Hombre | 72 | 1.0 (ref.) | 48 | 1.0 (ref.) | 49 | 1.0 (ref.) |
| Mujer | 6 | 0,79 (0,33-1,90) | 4 | 0,63 (0,21-1,84) | 3 | 0,50 (0,14-1,70) |
| LOCALIZACION | | | | | | |
| Cavidad Oral | 53 | 1.0 (ref.) | 37 | 1.0 (ref.) | 36 | 1.0 (ref.) |
| Glándulas salivares | 2 | 0,73 (0,16-3,22) | 4 | 5,94 (1,87-18,79) | 2 | 0,68 (0,13-3,43) |
| Orofaringe | 21 | 1,55 (0,85-2,81) | 10 | 0,84 (0,38-1,85) | 13 | 1,20 (0,57-2,54) |
| ESTADIO CLÍNICO | | | | | | |
| Precoz | 13 | 1.0 (ref.) | 11 | 1.0 (ref.) | 3 | 1.0 (ref.) |
| Avanzado | 65 | 2,76 (1,47-5,19) | 41 | 2,15 (1,05-4,38) | 49 | 9,84 (2,99-32,33) |
| IA | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| DEMORA | | | | | | |
| <1 mes | 16 | 1.0 (ref.) | 6 | 1.0 (ref.) | 6 | 1.0 (ref.) |
| 1-3 meses | 32 | 1,46 (0,79-2,72) | 22 | 2,78 (1,09-7,03) | 22 | 1,84 (0,79-4,28) |
| >3 meses | 29 | 1,53 (0,81-2,88) | 22 | 3,05 (1,21-7,69) | 22 | 2,15 (0,91-5,06) |
| desconocido | 1 | 0,54 (0,07-4,19) | 2 | 3,94 (0,75-20,50) | 2 | 1,45 (0,16-12,46) |
| INGESTA DE VEGETALES | | | | | | |
| <=4 | 41 | 1.0 (ref.) | 28 | 1.0 (ref.) | 26 | 1.0 (ref.) |
| 5-7 | 21 | 0,61 (0,35-1,08) | 12 | 0,45 (0,22-0,93) | 16 | 0,64 (0,33-1,25) |
| >=8 | 16 | 0,51 (0,28-0,93) | 12 | 0,50 (0,25-1,02) | 10 | 0,48 (0,22-1,05) |

- RRc¹: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización, estadio clínico, demora diagnóstica e ingesta de verduras.
- (ref.)²: categoría de referencia
- Valores en negrita denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05)